

SOX【胃】療法

注射薬

投与順序	外観	お薬の名前	お薬のはたらき
1		アピタ注+デキソ注	副作用（吐き気）を予防します。
2		オキサリプラチン注+デキソ注	治療のための薬です。約2時間かけて点滴します。

内服薬

投与順序	外観	お薬の名前	お薬のはたらき
1		エソメタドリン配合	治療のお薬です。1日目の夕食後より服用を開始し、15日目の朝食後まで服用します。
2		デキソメトリン錠 0.5mg	吐き気を予防するお薬です。

投与スケジュール

薬品名	日数																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
オキサリプラチン点滴静注液	↓																											
エソメタドリン配合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	休	休	休	休	休	休	休							

3週間毎に点滴治療を行います。飲み薬のエソメタドリンは、2週間続けて服用し、1週間お休みします。

SOX療法【胃】

よく起こる副作用

★末梢神経障害（チリブチリ）

- 発生時期** ○治療開始日から起こりますが2～3日後におさまることが多く、さほど長くは続きません。但し治療が長期になると回復するまでに時間がかかるようになり、症状が数ヶ月続くこともあります。
- 症状** ○手や足、口の周りや喉の周りのしびれや痛み、飲食物が飲み込みにくい、喉が締め付けられる様な感じがする、といった症状が起こることがあります。また治療を長く続けると、しびれや痛みが続き「ボタンがはずしにくい、細かな作業ができない」、「歩きにくい」などの症状があらわれることもあります。
- 対処法** ○冷気や、冷たいものに触れることで症状が出やすくなったり、悪化したりします。治療期間中は、冷たい食べ物や飲み物を避け、冷気や冷たい物に触れないよう注意し、体や皮膚を冷やさないようにして下さい。
- 少しでも症状があらわれるようになった場合には以下のことに気をつけましょう
- ・冬場の寒い日には、温かい服を着たり、スカーフや手袋を身に付けたりして、寒さから身を守るようにして下さい。
 - ☆暑いときでも、室内や車内を冷やしすぎたり、エアコンの冷気に直接あたらないようにしましょう。
 - ・足先は冷えやすいので、靴下やスリッパを履いて保温に努め、冷たい床を素足で歩かないようにして下さい。
 - ☆冷たいもの（金属製品・ドアノブ・車など）を直接触らないようにしましょう。
 - ☆飲み物は温かいものにし、氷やアイスクリーム、シャーベットなどを口にしないようにしましょう。（吐き気や口内炎があっても、氷を口にしないで下さい）
- 症状がひどいときには漢方薬やビタミン剤が処方されることがあります。またお薬を減量したり、治療をお休みする事もあります。
- 転倒に注意しましょう。熱いものや刃物を扱うときには、けがをしないように十分注意しましょう。

★骨髄障害

発生時期 薬剤投与日から7～14日に減少します

症状 骨髄には造血細胞と呼ばれる白血球（細菌などから体を守る）、血小板（出血を止める）、赤血球（酸素を運ぶ）の元になる細胞があり、この造血細胞にお薬が作用して造血細胞に障害を及ぼすことを骨髄抑制（障害）といいます。骨髄抑制が起こると、白血球、血小板、赤血球の数が減少し、その働きも弱くなり、感染症や出血、貧血などの症状があらわれやすくなります。

<代表的な症状>

- 感染症：37.5℃以上の発熱・寒気・ふるえ・のどの痛み など
- 貧血：疲れやすい、めまい、立ちくらみ、動悸、顔色が青白い など
- 出血：紫斑（原因不明のあざ）、歯茎からの出血、鼻血、月経量の増加、血が止まりにくい など

対処法 ○感染対策で最もポイントとなるのは、患者様自身の感染予防のセルフケアと感染の早期発見です。感染症をおこさないように、人ごみを避け、こまめにうがい、手洗いを行いましょう。白血球は一時的に下がっても、その後回復します。

○貧血では症状の自覚のないまま、転んだりして事故を起こす危険もあります。日常生活では十分な休養をとりましょう。また、いきなり動かず、動き始めはゆっくりとするように注意して下さい。

○血が止まりにくくなる場合がありますので、かみそりや爪きりのような鋭いものを使用する際には注意して下さい。打ち身や切り傷を作るような行為や激しい運動は控えるようにしましょう。歯ブラシも柔らかいものを使いましょう。

○症状に応じて、薬剤の投与や、輸血をする場合があります。

★悪心・嘔吐および食欲不振

★悪心・嘔吐および食欲不振

発生時期 薬剤投与日～5日目位まで
※まれに、以前の化学療法後の嘔吐の体験が影響し、点滴の数日前からおこるものがあります。

症状 食欲が落ちたり、味覚の変化、においに敏感になったり、胃が重たく感じたりします。ときどき吐くこともあります。

対処法 ○治療の前に吐き気止めの注射を行います。症状によっては吐き気止めの内服薬を服用することもあります。
○脱水をおこさないように水分はこまめにとるように心がけましょう。
○吐き気があるときは無理して食べる必要はありません。口当たりのよいものを少量ずつとりましょう。
○吐き気が強く食事できないときは、栄養や水分を点滴で補給することもあります。

頻度は少ないが注意を要する副作用

★手足症候群

発生時期 4～284日(約40週)

症状 ○手、足、爪の四肢末端部を好発部位として軽度のものでは紅斑、色素沈着に終わります。高度のものでは疼痛性に発赤腫脹し、水疱、びらんを形成します。手掌足底は角化、落屑が著明になって亀裂を生じるようになり知覚過敏、歩行困難、物がつかめないなどの機能障害を伴った症状がみられます。

対処法 ○現在のところ確立された治療法はありません。しかし、早い時期から保湿クリームなどを使用したり、ビタミン剤を服用することで悪化をふせぐことができます。
○症状によってはステロイド外用剤等を使用することがあります。

★アレルギー反応(過敏症)

発生時期 薬剤投与中～2, 3日後まで
特にアナフィラキシーショック(ごくまれな重篤なアレルギー反応)は投与5～10分以内が多い。

症状 そう痒(かゆみ)、紅潮(あかみ)、じんま疹、鼻閉(はなづまり)、咳、くしゃみ、吐き気・嘔吐、腹痛、浮腫(むくみ)などがあります。
アナフィラキシーショックのような重症な場合は、血圧低下、呼吸困難(息苦しい)、喘息、喘鳴、不整脈などがあらわれます。

対処法 ○アレルギー反応のおそれがある場合は、治療薬を投与する前に過敏症を防ぐ予防薬を使用します。
しかし投与中や、投与後にこうした異常を感じたら、すぐに知らせてください。

★下痢

発生時期 薬剤投与日から数日～数週間後に起こります。

症状 水のような便が夜間をとわず頻回に出ます。ときどきおなかがしぶるようになり痛くなります。

対処法 ○感染症を防ぐ為、排便後は肛門の周りを清潔に保ちましょう。
○周期的な腹痛、1日5回以上(もしくは通常よりも3回以上多い排便)の排便、夜中の下痢便が起こった場合はお知らせ下さい。
○症状によっては下痢止めが使われることがあります。
○下痢がひどくなり、液状・粘液状の便が続く時、あるいは血便や強い腹痛があるときはお知らせください。
○食事は温かく消化吸収のよいものを取りましょう。
○下痢によって水分が失われるので、スポーツドリンクなどで水分をたくさんとりましょう。
○辛い食べ物、冷たい食べ物、炭酸飲料やコーヒーも避けましょう。

★眼の症状 (スワンプタイル)

★眼の症状（エスワンタイホウ）

症 状	なみだ目、異物感（目がゴロゴロする）、かすみ目、視力低下、目やにがふえる など
対 処 法	○症状が出現した際には主治医へ相談し、必要があれば眼科を受診しましょう。眼科受診の際には眼科医に「エスワンタイホウ」を服用していることをお伝えください。 ○症状の予防・または眼科受診までの対処法として、防腐剤無添加の人工涙液（商品名：ソフトサンティア）のご使用をおすすめします。 ※水道水は、滅菌されていないので使わないでください。 ※眼科受診後は、医師の指示に従って治療を受けてください。 ※ソフトサンティアは調剤薬局やドラッグストアで販売されています。

その他の副作用

★脱毛（軽度）

発 生 時 期	○治療開始日から3週間目頃から始まりますが、治療が終われば必ず生えてきます。
症 状	○全て抜けてしまうのではなく、髪が薄くなることが多いです。
対 処 法	○治療中は頭皮も敏感になっていますので、シャンプーやブラッシングの回数を減らしたり、長時間のドライヤーは避けてください。

★その他

症 状	便秘、口内炎、倦怠感、味覚異常、血管痛、色素沈着等が起こることがあります。
対 処 法	○必要に応じて対症療法を行ないます。

副作用は薬剤ががん細胞を攻撃するときの一部の正常の細胞にも影響を与えてしまうことにより起こるものです。

もちろん正常な細胞は治療が終わればもとに戻りますし、副作用も少しずつ回復します。

副作用の出かたや、程度は個人によってさまざまであり、副作用の全てが現れるとは限りません。

大事なことは予想される副作用を十分理解し、その対処をすばやく行うことです。そして副作用があらわれた場合はもちろん、それ以外でも気になることがありましたらどんなことでも、主治医や看護師、薬剤師に相談して下さい。

医療法人敬愛会 中頭病院（薬剤部）

