

FOLFIRI【大腸】療法

注射薬

投与順序	外観	お薬の名前	お薬のはたらき
1		アチ静注+デキソ注	副作用(吐き気)をおさえるお薬です。
2		フルオキサ注	フルオキサ注の効果をもつて使用する。約2時間かけて点滴します。
3		フルオキサ塩酸塩点滴静注	治療の為のお薬です。約2時間かけてフルオキサと同時に点滴します。
4		フルオキサ注	治療の為のお薬です。フルオキサ注終了後に3分間かけて注射します。
5		フルオキサ注	治療の為のお薬です。この器具の中にお薬を入れて、少しずつお薬が入っていくように設定します。約46時間かけて点滴します。

内服薬

投与順序	外観	お薬の名前	お薬のはたらき
1		デキソ錠 0.5mg	副作用(吐き気)をおさえるお薬です。

投与スケジュール

薬品名	日数																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
レボリナート点滴静注用「ヤル	↓																												
リノカン塩酸塩点滴静注	↓																												
フルオウラシル注	↓																												
フルオウラシル注	→	→																											

2週間に1回治療します。

フォロワー療法【大腸】

よく起こる副作用

★骨髄障害

発生時期 薬剤投与日から7～14日後に減少します。

症 状 骨髄には造血細胞と呼ばれる白血球（細菌などから体を守る）、血小板（出血を止める）、赤血球（酸素を運ぶ）の元になる細胞があり、この造血細胞にお薬が作用して造血細胞に障害を及ぼすことを骨髄抑制（障害）といいます。骨髄抑制が起こると、白血球、血小板、赤血球の数が減少し、その働きも弱くなり、感染症や出血、貧血などの症状があらわれやすくなります。

<代表的な症状>

- 感染症：37.5℃以上の発熱・寒気・ふるえ・のどの痛み など
- 貧血：疲れやすい、めまい、立ちくらみ、動悸、顔色が青白い など
- 出血：紫斑（原因不明のあざ）、歯茎からの出血、鼻血、月経量の増加、血が止まりにくい など

対 処 法 ○感染対策で最もポイントとなるのは、患者様自身の感染予防のセルフケアと感染の早期発見です。感染症をおこさないように、人ごみを避け、こまめにうがい、手洗いを行いましょう。白血球は一時的に下がっても、その後回復します。
○貧血では症状の自覚のないまま、転んだりして事故を起こす危険もあります。日常生活では十分な休養をとりましょう。また、いきなり動かず、動き始めはゆっくりとするように注意して下さい。
○血が止まりにくくなる場合がありますので、かみそりや爪きりのような鋭いものを使用する際には注意して下さい。打ち身や切り傷を作るような行為や激しい運動は控えるようにしましょう。歯ブラシも柔らかいものを使いましょう。
○症状に応じて、薬剤の投与や、輸血をする場合があります。

★悪心・嘔吐および食欲不振

発生時期 薬剤投与日～5日目位まで

症 状 食欲が落ちたり、においに敏感になったり、胃が重たく感じたりします。ときどき吐くこともあります。

対 処 法 ○治療の前に吐き気止めの注射を行います。症状によっては吐き気止めの内服薬を服用することもあります。
○脱水をおこさないように水分はこまめにとるように心がけましょう。
○吐き気があるときは無理して食べる必要はありません。口当たりのよいものを少量ずつとりましょう。
○吐き気が強く食事できないときは、栄養や水分を点滴で補給することもあります。

★脱毛（軽度）

発生時期 ○治療開始日から3週間目頃から始まりますが、治療が終われば必ず生えてきます。

症 状 ○全て抜けてしまうのではなく、髪が薄くなることが多いです。

対 処 法 ○治療中は頭皮も敏感になっていますので、シャンプーやブラッシングの回数を減らしたり、長時間のドライヤーは避けてください。

★下痢

★下痢

発生時期 薬剤投与日から数日～数週間後に起こります。

症状 水のような便が夜間をとわず頻回に出ます。ときどきおなかがしぶるように痛くなります。

対処法

- 感染症を防ぐ為、排便後は肛門の周りを清潔に保ちましょう。
- 周期的な腹痛、1日5回以上(もしくは通常よりも3回以上多い排便)の排便、夜中の下痢便が起こった場合はお知らせ下さい。
- 症状に応じて、整腸剤や下痢止めを服用します。
- 下痢がひどくなり、液状・粘液状の便が続く時、あるいは血便や強い腹痛があるときはお知らせください。
- 食事は温かく消化吸収のよいものを取りましょう。
- 下痢によって水分が失われるので、スポーツドリンクなどで水分をたくさんとりましょう。
- 下痢の時は、辛い食べ物、冷たい食べ物、炭酸飲料やコーヒーも避けましょう。

頻度は少ないが注意を要する副作用

★間質性肺炎

発生時期 薬剤投与後数日～数週間

症状 ○発熱、から咳、呼吸困難(息苦しい)、頭痛、倦怠感などの風邪のような症状があらわれることがあります。

対処法 ○起きる頻度はまれですが、症状の軽いうち(風邪のような症状)から治療する必要があります。

その他の副作用

★その他

症状 便秘、倦怠感、口内炎、聴覚障害、味覚障害、手足の炎症、色素沈着など

対処法 ○必要に応じて対症療法を行います。

副作用は薬剤ががん細胞を攻撃するときの一部の正常の細胞にも影響を与えてしまうことにより起こるものです。

もちろん正常な細胞は治療が終わればもとに戻りますし、副作用も少しずつ回復します。

副作用の出かたや、程度は個人によってさまざまであり、副作用の全てが現れるとは限りません。

大事なことは予想される副作用を十分理解し、その対処をすばやく行うことです。そして副作用があらわれた場合はもちろん、それ以外でも気になることがありましたらどんなことでも、主治医や看護師、薬剤師に相談して下さい。

医療法人敬愛会 中頭病院 (薬剤部)

